



Rattrapage vaccinal ROR, recommandations antérieures, vaccins contre la rougeole / ROR et vérification sérologique

Etat : mars 2019

Rattrapage vaccinal ROR (2019)

Un rattrapage vaccinal ROR est recommandé pour toute personne née après 1963 et non immune ou n'ayant pas encore reçu une vaccination complète. Il s'adresse aussi aux enfants à partir de l'âge de 13 mois. Les personnes nées avant 1964 ont de fortes chances d'être déjà immunes contre la rougeole et la rubéole, pour avoir été en contact dans le passé avec des virus, et donc un rattrapage vaccinal ROR n'est plus indiqué.

Le rattrapage vaccinal comprend toujours, chez les personnes non vaccinées, 2 doses avec un intervalle d'au moins 4 semaines ; 1 dose suffit pour les personnes ayant déjà reçu une dose dans le passé. Si la vaccination ROR a eu lieu avec le Triviraten® (souche Rubini contre les oreillons), il est recommandé de la répéter (2 doses).

Le vaccin ROR peut être administré en toute sécurité et sans risque accru d'effets indésirables de la vaccination à toutes les personnes qui ont déjà eu l'une ou l'autre (ou plusieurs) des trois maladies ou qui ont déjà reçu l'une ou l'autre (ou plusieurs) vaccinations.

Aperçu des recommandations de vaccinations recommandées de base contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en Suisse

| Année | Age | Vaccin | Remarques |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1973 | 15 ans | Rubéole | filles |
| 1976 | 12 mois 12-15 ans | Rougeole Rubéole | (év. ROR) filles et jeunes femmes sans anticorps (év. oreillons pour les garçons, ou oreillons - rubéole) |
| 1981 | 18 mois 15 ans 15 ans | Rougeole Rubéole Oreillons | ou ROR filles, sauf en cas de vaccination ROR antérieure, et jeunes femmes garçons, sauf en cas de vaccination ROR antérieure |
| 1985 | 15-24 mois | ROR | |
| 1991 | 12-24 mois | ROR | |
| 1996 | 15 mois | ROR | |
| 1997 | 15 mois 4-7 ans | ROR ROR | 1 ^{ère} dose 2 ^{ème} dose |
| 2001 | 12 mois 15-24 mois | ROR ROR | 1 ^{ère} dose 2 ^{ème} dose |
| 2019 | 9 mois 12 mois | ROR ROR | 1^{ère} dose 2^{ème} dose |

Vaccins contre la rougeole

| Nom | Protection contre : | | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Attenuvax | Rougeole | Amunovax | Rougeole |
| Biviraten | Rougeole - oreillons | Diplovax HDC 4.0 | Rougeole |
| Eolarix | Rougeole - rubéole | Immrvax | Rougeole - oreill. - rubéole |
| Measles live vaccine* | Rougeole | Lirugen | Rougeole |
| MMR-I | Rougeole - oreill. - rubéole | LM-3 RIT | Rougeole - oreill. - rubéole |
| MMR-II | Rougeole - oreill. - rubéole | Lyovac | Rougeole |
| MMRVaxPro * | Rougeole - oreill. - rubéole | Masern-Impfstoff- | Rougeole |
| MMVax | Rougeole - oreillons | Mérieux | |
| Moraten | Rougeole | Measles virus | Rougeole |
| MoRu-Viraten | Rougeole - rubéole | Mevilin-L | Rougeole |
| Pluserix | Rougeole - oreill. - rubéole | MMR-Priorix | Rougeole - oreill. - rubéole |
| Priorix * | Rougeole- oreill. - rubéole | Mopavac Sevac | Rougeole - rubéole |
| Priorix Tetra * | Rougeole - oreill. - rubéole - varicelle | Morbilvax | Rougeole |
| ProQuad * | Rougeole - oreill. - rubéole - varicelle | Morupar | Rougeole - oreill. - rubéole |
| Rimevax | Rougeole | Morubel | Rougeole - rubéole |
| Rimparix | Rougeole - oreillons | Movivac | Rougeole |
| Rouvax | Rougeole | ROR Vax | Rougeole - oreill. - rubéole |
| Trimovax | Rougeole - oreill. - rubéole | Rouvax | Rougeole |
| Triviraten | Rougeole -(oreill**)- rubéole | Rudi-Rouvax | Rougeole - rubéole |
| | | Tresivax | Rougeole - oreill. - rubéole |
| | | Trimovax | Rougeole - oreill. - rubéole |
| | | Trivirix | Rougeole - oreill. - rubéole |
| | | Trivivac | Rougeole - oreill. - rubéole |
| | | VAS | Rougeole |
| | | VASPR | Rougeole - oreill. - rubéole |

*) Autorisés et disponibles
Etat: mars 2019

**) Triviraten : Protection contre les oreillons insuffisante

Parfois, seulement le nom de la maladie est noté dans le carnet de vaccinations. Ci-dessous quelques traductions de la parole **rougeole**, que vous pourriez remarquer :

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Suisse: | Masern (<i>allemand</i>) | morbillo (<i>italien</i>) | virustgel (<i>rumantsch</i>) |
| Europe de l'ouest: | measles (<i>anglais</i>) | mazelen (<i>néerlandais</i>) | mässling (<i>suédois</i>) |
| | sarampo (<i>portugais</i>) | sarampión (<i>espagnol</i>) | xarampió (<i>catalan</i>) |
| Europe de l'est: | odra (<i>polonais</i>) | spalničky (<i>tchèque</i>) | kanyaró (<i>hongrois</i>) |
| | ospice (<i>bosniaque-croate-serbe</i>) | pojar (<i>roumain</i>) | fruth (<i>albanais</i>) |
| | ιλαρά (<i>grec</i>) | kip (<i>ukrainien</i>) | корь (<i>russe</i>) |
| Eurasie: | kizamik (<i>turc</i>) | tigdas (<i>tagalog</i>) | bệnh sởi (<i>viétnamien</i>) |

Remarque :

Dans le carnet de vaccinations, on trouve quelque fois le nom "**Moruman**". Il s'agit d'**immunoglobulines (IgG)** contre la rougeole, qui sont parfois utilisées chez les nourrissons et les femmes enceintes après un contact avec une personne infectieuse de la rougeole. Les IgG *ne devrait pas* être considérées comme un vaccin.

Vérification sérologique

Un contrôle sérologique après la vaccination ROR *n'est pas* recommandé chez les personnes en bonne santé. Il ne présente qu'un intérêt limité à cause de résultats souvent faux-négatifs et parce qu'il n'existe pas un corrélat sérologique de protection, notamment dans le cas des oreillons.

La recherche des IgG spécifiques (rubéole, rougeole) en cas de grossesse n'est recommandée que chez les femmes n'ayant pas été vaccinées ou dont le statut vaccinal n'est pas connu. Lors des consultations gynécologiques de femmes en âge de procréer, il convient de contrôler systématiquement le statut vaccinal de chaque nouvelle patiente et, si nécessaire, de compléter immédiatement les vaccinations manquantes au moyen d'un vaccin ROR (1 ou 2 doses) si la femme n'est pas enceinte, sans effectuer de sérologie.

Vu la protection élevée conférée par le vaccin contre la rubéole, il est recommandé *de ne pas* effectuer de sérologie de rubéole après 2 doses de vaccin documentées.